



IMVP-16 XC656 (европейский протокол) НХЛ острая

Дни терапии	Лекарствен ное средство	Дозировка, мг/м²	Растворите ль	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения		
1-5	Ифосфамид	1000	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно		
3, 10	Метотрексат	30	0,9% NaCl	100 мл	15 минут	внутривенно		
1-3	Этопозид	100	0,9% NaCl	500 мл	2 часа	внутривенно		

График введения препаратов:

						<u> </u>															$\overline{}$
-	7	m	4	2	9	7	œ	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Ифосфамид																					
Метотрексат																					
Этопозид																					

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА: 22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ: 2

Примечание:

Если общая доза составляет ≥200 мг, Этопозид растворяют в 1000 мл 0,9% раствора NaCl. Месна: 200 мг/м2 в 500 мл 0,9% раствора NaCl в течение 30 минут сразу после приема Ифосфамида, затем 1000 мг/м2 в течение 12 часов. (начиная с приема Ифосфамида). Авторы: <u>Thomas Kühr</u>, <u>Ewald Wöll</u>, <u>Josef Thaler</u> (руководство «Протоколы химиотерапии 2016.

Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г. Литература:

Cabanillas F. et al., Blood 60: 693ff, 1982.

