

# Винфлунин ХС882 (европейський протокол) Рак мочевого пузыря

Дни терапії	Лекарственне средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Винфлунин	320	0,9% NaCl	100 мл	20 минут	внутривенно

## График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Винфлунин</b>																					

## Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

### Примечание:

**Внимание!** Необходимо обеспечить полную защиту от попадания света.

**Внимание!** Тромбофлебит; в случае периферийного доступа после Винфлунина вводится 100 мл 0,9% раствора NaCl.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

### Литература:

Krzakowski M. et al., J Clin Oncol 28: 2167ff, 2010.

