

## Карбоплатин / Паклитаксел + Бевацизумаб ХС772 + ХА060 (европейский протокол) Рак яичника

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Бевацизумаб	15 мг/кг	0,9% NaCl	100 мл	90 минут	внутривенно
1	Карбоплатин	AUC 6	5% Глюкоза	500 мл	30 минут	внутривенно
1	Паклитаксел	175	0,9% NaCl	500 мл	3 часа	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Бевацизумаб</b>																					
<b>Карбоплатин</b>																					
<b>Паклитаксел</b>																					

### Дополнительная информация

**Примечание:**

Паклитаксел разводят до 0,3-1,2 мг/мл.

**Расчет дозы Карбоплатина (формула Calvert):**

**Доза (мг) = целевая AUC x (СКФ + 25).**

(\***) Бевацизумаб:** Начальную дозу вводят в течение 90 минут. В случае хорошей переносимости первой инфузии, вторую инфузию вводят в течение 60 минут. В случае хорошей переносимости 60-минутной инфузии, все последующие инфузии можно вводить в течение 30 минут.

Разведенные растворы Паклитаксела вводят через инфузионные системы без ПВХ.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук). Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

**Литература:**

Burger et al., N Engl J Med 365: 2473ff, 2011.

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

