

## Карбоплатин / Доцетаксел ХС184 (европейский протокол) Рак яичника

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1	Доцетаксел	75	0,9% NaCl	500	1 час	внутривенно
1	Карбоплатин	AUC 5	5% Глюкоза	500	30 минут	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Доцетаксел</b>																					
<b>Карбоплатин</b>																					

### Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:  
22 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6**

#### Примечание:

Доцетаксел разводят до 0,3-0,74 мг/мл.

#### Сопутствующая медикация:

Дексаметазон 8 мг орально 2 раза в день в течение 3 суток, начиная в 1 день перед приемом Доцетаксела.

#### Расчет дозы Карбоплатина (формула Calvert):

**Доза (мг) = целевая AUC x (СКФ + 25).**

#### Литература:

Vasey P.A. et al., J. Natl Cancer Inst 96: 1682ff, 2004.

