

# Карбоплатин / Циклофосфамид ХС184 (европейський протокол) Рак яичника

Дни терапії	Лекарственне средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Карбоплатин	300	5% Глюкоза	500 мл	1 час	внутривенно
1	Циклофосфамид	600	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно

## График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Карбоплатин</b>																												
<b>Циклофосфамид</b>																												

## Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:  
29 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6**

### Примечание:

**Месна: 20% дозы Циклофосфамида (если общая доза 1000 мг) внутривенно или орально через 0, 4, 8 часов после приема Циклофосфамида.**

**Надлежащий диурез.**

**Расчет дозы Карбоплатина (формула Calvert):**

**Доза (мг) = целевая AUC x (СКФ + 25).**

**Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)**

**(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).**

**Последнее изменение содержания: январь 2016 г.**

**Литература:**

**Swenerton K. et al., J Clin Oncol 10: 718ff, 1992.**

