

Пегилированный липосомальный Доксорубин ХС452 (европейский протокол) Рак яичника

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м ² | Растворитель | Объем (мл) | Время введения | Путь введения |
|-------------|---|------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| 1 | Пегилированный липосомальный доксорубин | 50 | 5% Глюкоза | 500 | 1 час | внутривенно |

График введения препаратов:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Пегилированный липосомальный доксорубин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:

Пегилированный липосомальный доксорубин растворяют в 250 мл 5% раствора глюкозы, если общая доза ≤ 90 мг и в 500 мл 5% раствора глюкозы, если общая доза превышает 90 мг.

Литература:

Gordon A., J Clin Oncol 19: 3312ff, 2001.

