

## Пегилированный липосомальный Доксорубин ХС452 (европейский протокол) Рак яичника

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Пегилированный липосомальный доксорубин	50	5% Глюкоза	500 мл	1 час	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Пегилированный липосомальный доксорубин</b>																												

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

#### Примечание:

Пегилированный липосомальный доксорубин растворяют в 250 мл 5% раствора глюкозы, если общая доза  $\leq 90$  мг и в 500 мл 5% раствора глюкозы, если общая доза превышает 90 мг.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

#### Литература:

Gordon A., J Clin Oncol 19: 3312ff, 2001.

