

## Топотекан / Бевацизумаб ХС836 + ХА060 (европейський протокол) Рак яичника

Дни терапії	Лекарственне средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1, 15	Бевацизумаб	10 мг/кг	0,9% NaCl	100	90 минут	внутривенно
1, 8, 15	Топотекан	4	0,9% NaCl	50	30 минут	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Бевацизумаб</b>																												
<b>Топотекан</b>																												

### Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:  
29 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6**

#### Примечание:

Топотекан разводят до 0,025-0,05 мг/мл.

(\*) Бевацизумаб: Начальную дозу вводят в течение 90 минут. В случае хорошей переносимости первой инфузии, вторую инфузию вводят в течение 60 минут. В случае хорошей переносимости 60-минутной инфузии, все последующие инфузии можно вводить в течение 30 минут.

#### Литература:

Pujade-Lauraine E. et al., J Clin Oncol 32: 1302ff, 2014.

