

Топотекан / Бевацизумаб ХС836 + ХА060 (европейський протокол) Рак яичника

| Дни терапії | Лекарственне средство | Дозировка, мг/м ² | Растворитель | Объем (мл) | Время введения | Путь введения |
|-------------|-----------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| 1, 15 | Бевацизумаб | 10 мг/кг | 0,9% NaCl | 100 | 90 минут | внутривенно |
| 1, 8, 15 | Топотекан | 4 | 0,9% NaCl | 50 | 30 минут | внутривенно |

График введения препаратов:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Бевацизумаб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Топотекан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:
29 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6**

Примечание:

Топотекан разводят до 0,025-0,05 мг/мл.

(*). Бевацизумаб: Начальную дозу вводят в течение 90 минут. В случае хорошей переносимости первой инфузии, вторую инфузию вводят в течение 60 минут. В случае хорошей переносимости 60-минутной инфузии, все последующие инфузии можно вводить в течение 30 минут.

Литература:

Pujade-Lauraine E. et al., J Clin Oncol 32: 1302ff, 2014.

