

Топотекан / Бевацизумаб ХС836 + ХА060 (европейський протокол) Рак яичника

Дни терапії	Лекарственне средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 15	Бевацизумаб	10 мг/кг	0,9% NaCl	100 мл	90 минут	внутривенно
1, 8, 15	Топотекан	4	0,9% NaCl	50 мл	30 минут	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Бевацизумаб																												
Топотекан																												

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:

Топотекан разводят до 0,025-0,05 мг/мл.

(*) Бевацизумаб: Начальную дозу вводят в течение 90 минут. В случае хорошей переносимости первой инфузии, вторую инфузию вводят в течение 60 минут. В случае хорошей переносимости 60-минутной инфузии, все последующие инфузии можно вводить в течение 30 минут.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Pujade-Lauraine E. et al., J Clin Oncol 32: 1302ff, 2014.

