

ДНАР ХС408 (европейский протокол) НХЛ острая

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Дексаметазон	40 (const)	-	0	-	перорально
2	Цисплатин	100	0,9% NaCl	1000 мл	24 часа	внутривенно
1-4	Цитозин-арабинозид	2 x 2000	0,9% NaCl	2*500	3 часа каждые 12 часов	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Дексаметазон																					
Цисплатин																					
Цитозин-арабинозид																					

Дополнительная информация

Примечание:

Цитозин-арабинозид: Дозировка 1000 мг/м² у пациентов >70 лет.

Дексаметазон: Прием перорально или внутривенно в виде инфузий в течение 15 минут.

Цисплатин (только если СКФ ≥60 мл/мин.):

Сопутствующая медикация:

Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO₄ внутривенно в течение 60 мин.

200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.

Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Velasquez W. et al., Blood 71: 117ff, 1988.

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
2

