

## ДНАР ХС408 (европейский протокол) НХЛ острая

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Дексаметазон	40 (const)	-	0	-	перорально
2	Цисплатин	100	0,9% NaCl	1000 мл	24 часа	внутривенно
1-4	Цитозин-арабинозид	2 x 2000	0,9% NaCl	2*500	3 часа каждые 12 часов	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Дексаметазон</b>																					
<b>Цисплатин</b>																					
<b>Цитозин-арабинозид</b>																					

### Дополнительная информация

#### Примечание:

**Цитозин-арабинозид:** Дозировка 1000 мг/м<sup>2</sup> у пациентов >70 лет.

**Дексаметазон:** Прием перорально или внутривенно в виде инфузий в течение 15 минут.

**Цисплатин (только если СКФ ≥60 мл/мин.):**

**Сопутствующая медикация:**

**Премедикация:** 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO<sub>4</sub> внутривенно в течение 60 мин.

200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.

**Постмедикация:** 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.

**Авторы:** [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

**Последнее изменение содержания:** январь 2016 г.

**Литература:**

**Velasquez W. et al., Blood 71: 117ff, 1988.**

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
2

