хемотека
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

DHAP XC408 (европейский протокол) НХЛ острая

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м^2	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Дексаметазон	40 (const)	-	0	-	перорально
2	Цисплатин	100	0,9% NaCl	1000 мл	24 часа	внутривенно
1-4	Цитозин-арабинозид	2 x 2000	0,9% NaCl	2*500	3 часа каждые 12 часов	внутривенно

График введения препаратов:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Дексаметазон																						
	■																					
Цисплатин																						
		■																				
Цитозин-арабинозид																						
	■	■	■	■																		

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
2

Примечание:
Цитозин-арабинозид: Дозировка 1000 мг/м2 у пациентов >70 лет.
Дексаметазон: Прием перорально или внутривенно в виде инфузий в течение 15 минут.
Цисплатин (только если СКФ ≥60 мл/мин.):
Сопутствующая медикация:
Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO4 внутривенно в течение 60 мин.
200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.
Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.
Авторы: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).
Последнее изменение содержания: январь 2016 г.
Литература:
Velasquez W. et al., Blood 71: 117ff, 1988.