

## Паклитаксел / Топотекан / Бевацизумаб ХС836 + ХА060 (европейський протокол) Рак шийки матки

| Дни терапії | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м <sup>2</sup> | Растворитель | Объем (мл / шт) | Время введения | Путь введения |
|-------------|------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1           | Бевацизумаб            | 10 мг/кг                     | 0,9% NaCl    | 100 мл          | 90 минут       | внутривенно   |
| 1           | Паклитаксел            | 175                          | 0,9% NaCl    | 500 мл          | 3 часа         | внутривенно   |
| 1-3         | Топотекан              | 0,75                         | 0,9% NaCl    | 50 мл           | 30 минут       | внутривенно   |

### График введения препаратов:

| 1                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>Бевацизумаб</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Паклитаксел</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Топотекан</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### Дополнительная информация

#### Примечание:

Паклитаксел разводят до 0,3-1,2 мг/мл.

Сопутствующая медикация до Паклитаксела:

Дексаметазон, 20 мг внутривенно за 30 минут до

Паклитаксела или Дексаметазона - 20 мг орально за 6 и 12

часов до Паклитаксела. Рекомендована дополнительная

премедикация 50 мг Ранитидина и 30 мг Дифенгидрамина.

Топотекан разводят до 0,025-0,05 мг/мл.

(\* Бевацизумаб: Начальную дозу вводят в течение 90

минут. В случае хорошей переносимости первой инфузии,

вторую инфузию вводят в течение 60 минут. В случае

хорошей переносимости 60-минутной инфузии, все

последующие инфузии можно вводить в течение 30 минут.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство

«Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и

таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Tewari K.S. et al., N Engl J Med 370: 734ff, 2014.

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

