

## Винорелбин / Гидрокортизон ХС884 (европейский протокол) Рак простаты

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8	Винорелбин	30	0,9% NaCl	100 мл	10 минут	внутривенно
1-21	Гидрокортизон	40 (const)	-	0	-	перорально

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Винорелбин</b>																					
<b>Гидрокортизон</b>																					

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

#### Примечание:

Винорелбин вводится быстро внутривенно.

Внимание! Тромбофлебит; угроза некроза после экстравазации, поэтому желательное применение катетера "Port-A-Cath". После чего 250 мл 0,9% раствора NaCl.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

#### Литература:

Abratt R.P. et al., Ann Oncol 15: 1613ff, 2004.

