

## Кабазитаксел / Преднизолон ХС166 (европейский протокол) Рак простаты

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Кабазитаксел	25	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно
1-30	Преднизолон	10 мг (const)	-	0	-	перорально

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Кабазитаксел</b>																					
<b>Преднизолон</b>																					

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

#### Примечание:

Кабазитаксел разводят до 0,1-0,26 мг/мл.

#### Сопутствующая медикация:

Рекомендовано до приема Кабазитаксела назначить Дексаметазона 8 мг, Ранитидина 50 мг и Дифенгидрамина 30 мг.

Разведенные растворы Кабазитаксела вводят через инфузионные системы без ПВХ.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

#### Литература:

De Bono J.S. et al., Lancet 376: 1147ff, 2010.

