

## Цисплатин / Этопозид / Блеомицин (сутки 1-5: ХС788; сутки 8, 15: ХА149) (европейский протокол) Рак яичка

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15	Блеомицин	30 (const)	-	0	Болюс	внутривенно
1-5	Цисплатин	20	0,9% NaCl	500	30 минут	внутривенно
1-5	Этопозид	100	0,9% NaCl	500	1 час	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Блеомицин</b>																					
<b>Цисплатин</b>																					
<b>Этопозид</b>																					

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
4

#### Примечание:

Если общая доза составляет  $\geq 200$  мг, Этопозид растворяют в 1000 мл 0,9% раствора NaCl.

Цисплатин (только если СКФ  $\geq 60$  мл/мин.):

Сопутствующая медикация:

Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO<sub>4</sub> внутривенно в течение 60 мин.

200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.

Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.

Литература:

Williams S.D. et al., N Engl J Med 316: 1435ff, 1987.

