

Цисплатин / Этопозид / Ифосфамид ХС796 (европейский протокол) Рак яичка

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1-5	Ифосфамид	1200	0,9% NaCl	500	1 час	внутривенно
1-5	Цисплатин	20	0,9% NaCl	500	30 минут	внутривенно
1-5	Этопозид	75	0,9% NaCl	1000	1 час	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Ифосфамид																												
Цисплатин																												
Этопозид																												

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
5

Примечание:

Месна: 20% дозы Ифосфамида, через 0, 4, 8 ч после приема Ифосфамида (перорально или внутривенно).

Повышенный риск токсичности для ЦНС, если альбумин ≤ 3.5 г/дл.

Цисплатин (только если СКФ ≥ 60 мл/мин.):

Сопутствующая медикация:

Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO₄ внутривенно в течение 60 мин.

200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.

Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.

Литература:

Loehrer P.J. et al., J Clin Oncol 16: 2500ff, 1998.

