

## Цисплатин / Этопозид / Ифосфамид ХС796 (европейский протокол) Рак яичка

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1-5	Ифосфамид	1200	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно
1-5	Цисплатин	20	0,9% NaCl	500 мл	30 минут	внутривенно
1-5	Этопозид	75	0,9% NaCl	1000 мл	1 час	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Ифосфамид</b>																												
<b>Цисплатин</b>																												
<b>Этопозид</b>																												

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
5

#### Примечание:

Месна: 20% дозы Ифосфамида, через 0, 4, 8 ч после приема Ифосфамида (перорально или внутривенно).

Повышенный риск токсичности для ЦНС, если альбумин  $\leq 3.5$  г/дл.

Цисплатин (только если СКФ  $\geq 60$  мл/мин.):

Сопутствующая медикация:

Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO4 внутривенно в течение 60 мин.

200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.

Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Loehrer P.J. et al., J Clin Oncol 16: 2500ff, 1998.

