

Флударабин ХС548 (европейский протокол) НХЛ хроническая

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1-5	Флударабин а фосфат	25	0,9% NaCl	250 мл	30 минут	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Флударабина фосфат																												

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
2

Примечание:

Внимание! Синдром распада опухоли и нарушения функции Т-лимфоцитов.

Флударабина фосфат также можно вводить подкожно (40 мг/м² дни 1-5 и с повтором на 29 сутки).

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

The French Cooperative Group on CLL, Lancet 347: 1432ff, 1996; Rossi J.F. et al., J Clin Oncol 22: 1260ff, 2004.

