

Офатумумаб ХА078 (европейский протокол) - Часть 1

НХЛ хроническая

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м ² | Растворитель | Объем (мл / шт) | Время введения | Путь введения |
|-------------|------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1 | Офатумумаб | 2000** | 0,9% NaCl | 1000 мл | 4 часа | внутривенно |

График введения препаратов:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Офатумумаб | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Дополнительная информация

Повторно: (*) еженедельно (доза 1-8), затем каждые 4 недели (доза 9-12).

Дни терапии: 1,8,15,22,29,36,43,50*

Примечание:

(**) Первичная доза препарата Офтамумаб 300 мг (= доза 1); схема приема других доз: 2000 мг (= доза 2-12).

Рекомендованная скорость инфузий:

| Интервал (мин.) | Доза 1 (мл/ч) | Доза 2 (мл/ч) | Доза 3-12 (мл/ч) |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 0-30 | 12 | 12 | 24 |
| 31-60 | 25 | 25 | 50 |
| 61-90 | 50 | 50 | 100 |
| 91-120 | 100 | 100 | 200 |
| >120 | 200 | 200 | 400 |

Рекомендована премедикация Ацетаминофеном, Антигистаминами и кортикостероидами.

Применение только через встроенный фильтр.

Внимание - для продолжения полного курса терапии смотрите схему - Офатумумаб ХА078 (европейский протокол) - Часть 2.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).
Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Wierda W.G. et al., J Clin Oncol 28: 1749ff, 2009.

ПОВТОРНО НА:
8 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
4

