хемотека
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

FEC / Доцетаксел (режим PACS 01) XC532 (FEC); XC416 (Доцетаксел) (европейский протокол) - Часть 2 Рак молочной железы

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м^2	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
3,5,12	Доцетаксел	100	0,9% NaCl	250 мл	1 час	внутривенно
1-5,10-15	Флюороурацил	400	5% Глюкоза	0	-	внутривенно

График введения препаратов:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Доцетаксел			■		■							■										
Флюороурацил	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■							

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
3

Примечание:
Внимание! Данная схема действительна и применяется после схемы - FEC / Доцетаксел (режим PACS 01) XC532 (FEC); XC416 (Доцетаксел) (европейский протокол) - Часть 1.
Доцетаксел разводят до 0,3-0,74 мг/мл.
Сопутствующая медикация:
Дексаметазон 8 мг орально 2 раза в день в течение 3 суток, начиная в 1 день перед приемом Доцетаксела.
Литература:
Roche H. et al., J Clin Oncol 24: 5664ff, 2006.