

## Гемцитабин / Цисплатин ХС592 (сутки 1), ХС592 (сутки 8) (европейский протокол) Рак молочной железы

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
5,10	Винбластин	6	5% Глюкоза	0	-	перорально
1,8	Гемцитабин	750	0,9% NaCl	250 мл	30 минут	внутривенно
3,10	Метотрексат	30	5% Глюкоза	0	-	внутривенно
1	Флюороурацил	400	5% Глюкоза	200 мл	30	перорально
1,8	Цисплатин	30	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Винбластин</b>																					
<b>Гемцитабин</b>																					
<b>Метотрексат</b>																					
<b>Флюороурацил</b>																					
<b>Цисплатин</b>																					

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6

#### Примечание:

Цисплатин (только если СКФ ≥60 мл/мин.):

Сопутствующая медикация:

Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO4 внутривенно в течение 60 мин.

200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.

Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.

Литература:

Nagourney RA et al., J Clin Oncol 18: 2245ff, 2000.

