

## IMVP-16 ХС656 (европейский протокол) НХЛ острая

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1-5	Ифосфамид	1000	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно
3,10	Метотрексат	30	0,9% NaCl	100 мл	15 минут	внутривенно
1-3	Этопозид	100	0,9% NaCl	500 мл	2 часа	внутривенно
2-10	Винорелбин	25	0,9% NaCl	500 мл	-	перорально

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Ифосфамид</b>																					
■	■	■	■	■																	
<b>Метотрексат</b>																					
		■							■												
<b>Этопозид</b>																					
■	■	■																			
<b>Винорелбин</b>																					
	■	■	■	■	■	■	■	■	■												

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
2

#### Примечание:

Если общая доза составляет  $\geq 200$  мг, Этопозид растворяют в 1000 мл 0,9% раствора NaCl.

Месна: 200 мг/м<sup>2</sup> в 500 мл 0,9% раствора NaCl в течение 30 минут сразу после приема Ифосфамида, затем 1000 мг/м<sup>2</sup> в течение 12 часов. (начиная с приема Ифосфамида).

#### Литература:

Cabanillas F. et al., Blood 60: 693ff, 1982.

