

Бендамустин / Ритуксимаб ХА153 + ХА090 (европейский протокол) НХЛ хроническая

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1, 2	Бендамустин	90	0,9% NaCl	500	30 минут	внутривенно
1	Ритуксимаб	375	0,9% NaCl	500	5 часов (3 часа)	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Бендамустин																												
Ритуксимаб																												

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
2

Примечание:

Ритуксимаб: Начальная скорость инфузий - 50 мг/ч; через 30 минут ее можно увеличивать на 50 мг/ч каждые 30 минут, максимально до 400 мг/ч.

Дальнейшие дозы вводятся на начальной скорости 100 и увеличиваются на 100 мг/ч каждые 30 минут, максимально до 400 мг/ч.

Рекомендована премедикация - 30 мг

Дифенгидрамина.

Литература:

Rummel M.J. et al., Lancet 381: 1203ff, 2013.

