хемотека
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

# Хлорамбуцил / Обинутузумаб XA076 (европейский протокол) НХЛ хроническая

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м$^2$ | Растворитель | Объем (мл / шт) | Время введения | Путь введения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 8, 15 | Обинутузумаб | 1000 мг (const) | 0,9% NaCl | 500 мл | 4 часа** | внутривенно |
| 1, 15 | Хлорамбуцил | 0,5 мг/кг | - | 0 | - | перорально |

**График введения препаратов:**




**Дополнительная информация**

**ПОВТОРНО НА:**
**29 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:**
**2**

**Примечание:**
**(*) Обинутузумаб только на первые сутки, начиная со 2-го цикла и далее.**
**(**) Обинутузумаб, 1-й цикл.**
**Сутки 1: 100 мг, введение со скоростью 25 мг/ч в течение 4 ч.**
**Сутки 2: 900 мг; введение со скоростью 50 мг/ч; скорость инфузий можно увеличивать на 50 мг/ч каждые 30 минут, максимально до 400 мг/ч.**
**Сутки 8 или 15: Введение инфузии начинается со скоростью 100 мг/ч и увеличивается на 100 мг/ч каждые 30 минут, максимально до 400 мг/ч.**
**Рекомендована премедикация - 30 мг Дифенгидрамина.**
**Авторы: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).**
**Последнее изменение содержания: январь 2016 г.**
**Литература:**
**Goede V. et al., N Engl J Med 370: 1011ff, 2014.**