

Хлорамбуцил / Обинутузумаб ХА076 (европейский протокол) НХЛ хроническая

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15	Обинутузумаб	1000 мг (const)	0,9% NaCl	500 мл	4 часа**	внутривенно
1, 15	Хлорамбуцил	0,5 мг/кг	-	0	-	перорально

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Обинутузумаб																												
█							█							█														
Хлорамбуцил																												
█														█														

Дополнительная информация

Примечание:

(*) Обинутузумаб только на первые сутки, начиная со 2-го цикла и далее.

(**) Обинутузумаб, 1-й цикл.

Сутки 1: 100 мг, введение со скоростью 25 мг/ч в течение 4 ч.

Сутки 2: 900 мг; введение со скоростью 50 мг/ч; скорость инфузий можно увеличивать на 50 мг/ч каждые 30 минут, максимально до 400 мг/ч.

Сутки 8 или 15: Введение инфузии начинается со скоростью 100 мг/ч и увеличивается на 100 мг/ч каждые 30 минут, максимально до 400 мг/ч.

Рекомендована премедикация - 30 мг Дифенгидрамина.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Goede V. et al., N Engl J Med 370: 1011ff, 2014.

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
2

