хемотека
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Хлорамбуцил / Обинутузумаб XA076 (европейский протокол) НХЛ хроническая

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м^2	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15	Обинутузумаб	1000 мг (const)	0,9% NaCl	500 мл	4 часа**	внутривенно
1, 15	Хлорамбуцил	0,5 мг/кг	-	0	-	перорально

График введения препаратов:



Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
2

Примечание:
(*) Обинутузумаб только на первые сутки, начиная со 2-го цикла и далее.
(**) Обинутузумаб, 1-й цикл.
Сутки 1: 100 мг, введение со скоростью 25 мг/ч в течение 4 ч.
Сутки 2: 900 мг; введение со скоростью 50 мг/ч; скорость инфузий можно увеличивать на 50 мг/ч каждые 30 минут, максимально до 400 мг/ч.
Сутки 8 или 15: Введение инфузии начинается со скоростью 100 мг/ч и увеличивается на 100 мг/ч каждые 30 минут, максимально до 400 мг/ч.
Рекомендована премедикация - 30 мг Дифенгидрамина.
Авторы: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).
Последнее изменение содержания: январь 2016 г.
Литература:
Goede V. et al., N Engl J Med 370: 1011ff, 2014.