

HD 5FU (изменена в соответствии с режимом Ardan) XA149 (европейский протокол) Колоректальный рак

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
10	Винкрестин	1(*)	5% Глюкоза	0	-	внутривенно
1	Винорелбин	25	5% Глюкоза	0	-	внутривенно
3	Доцетаксел	36	5% Глюкоза	0	-	внутривенно
1,8,15,22, 29,36	Кальция фолинат	500	0,9% NaCl	250 мл	2 часа	внутривенно
1,8,15,22, 29,36	Флюороурацил	2600	0,9% NaCl	1000 мл	22 часа	внутривенно
1,7	Циклофосфамид	250	0,9% NaCl	0	-	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Винкрестин																															
Винорелбин																															
Доцетаксел																															
Кальция фолинат																															
Флюороурацил																															
Циклофосфамид																															

Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:
50 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6**

Примечание:

Количество циклов: в случае хорошей переносимости продолжать в течение всего заболевания.

(*) Кальций фолинат как модулятор 5-флуороурацила должен применяться перед 5-флуороурацилом.

Литература:

Weh H.J. et al., Ann Oncol 5: 233ff, 1994.

