chemoteka.com



HD 5FU (изменена в соответствии с режимом Ardalan) XA149 (европейский протокол) Колоректальный рак

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения			
10	Винкристин	1(*)	5% Глюкоза	0	-	внутривенно			
1	Винорелбин	25	5% Глюкоза	0	-	внутривенно			
3	Доцетаксел	36	5% Глюкоза	0	-	внутривенно			
1,8,15,22, 29,36	Кальция фолинат	500	0,9% NaCl	250 мл	2 часа	внутривенно			
1,8,15,22, 29,36	Флюороурацил	2600	0,9% NaCl	1000 мл	22 часа	внутривенно			
1,7	Циклофосфамид	250	0,9% NaCl	0	-	внутривенно			

График введения препаратов:

i pe	ıψı	IN D	ьсд	-	7 111	JE110	apa	IUB.																						
-1	7	т	4	2	9	7	∞	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	56	27	28	29	30	31
Винкристин																														
Винорелбин																														
До	цет	акс	ел	•	•				•		•												•	•						
Ka	ЛЬЦ	ия (рол	ина	т	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•		•	•	•		•		•		•	•		
Φ-																														
Ψл	юор	ooy	рац	ил				_																						
Циклофосфамид																														
								1												1			L							Ì

Дополнительная информация

повторно на: 50 (день) количество циклов: 6

Примечание:

Количество циклов: в случае хорошей переносимости продолжать в течение всего заболевания.

(*) Кальций фолинат как модулятор 5-флуороурацила должен применяться перед 5-флуороурацилом.

Литература:

Weh H.J. et al., Ann Oncol 5: 233ff, 1994.