

## 5FU / Лейковорин / Оксалиплатин (FOLFOX IV) + Бевацизумаб ХС588 + ХА060 (европейский протокол) Колоректальный рак

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
4	Доцетаксел	36	5% Глюкоза	0	-	болюс
1,2,15,16	Кальция фолинат	200	0,9% NaCl	250 мл	2 години	внутривенно
5	Паклитаксел	80	5% Глюкоза	0	-	внутривенно
1,2,15,16	Флуороурацил	400	-	0	Болюс	внутривенно
1,2,15,16	Флуороурацил	600	0,9% NaCl	500 мл	22 години	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Доцетаксел</b>																												
<b>Кальция фолинат</b>																												
<b>Паклитаксел</b>																												
<b>Флуороурацил</b>																												
<b>Флуороурацил</b>																												

### Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:  
29 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6**

#### Примечание:

(\* ) Кальций фолинат как модулятор 5-флуороурацила должен применяться перед 5-флуороурацилом.

(\* ) Бевацизумаб: Начальную дозу вводят в течение 90 минут. В случае хорошей переносимости первой инфузии, вторую инфузию вводят в течение 60 минут. В случае хорошей переносимости 60-минутной инфузии, все последующие инфузии можно вводить в течение 30 минут.

#### Литература:

Saltz et al., J Clin Oncol 26: 2013ff, 2008.

