хемотека
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Доцетаксел (еженедельно) XC412 (европейский протокол) Рак молочной железы

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м^2	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15, 22, 29, 36	Доцетаксел	36	0,9% NaCl	100 мл	1 час	внутривенно

График введения препаратов:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Доцетаксел																															

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
50 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
4

Примечание:
Доцетаксел разводят до 0,3-0,74 мг/мл.
Риск возникновения мукозита снижают путем сокращения цикла (сутки 1, 8, 15, повторно - 29 сутки).
Сопутствующая медикация: Дексаметазон 8 мг орально 2 раза в день в течение 3 суток, начиная в 1 день перед приемом Доцетаксела.
В случае отсутствия реакции гиперчувствительности, дозу Доксаметазона можно снизить до 2х 4 мг орально в день приема Доцетаксела.
Литература:
Hainsworth J.D. et al., J Clin Oncol 19: 3500ff, 2001.