

## Доцетаксел (еженедельно) ХС412 (европейский протокол) Рак молочной железы

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1, 8, 15, 22, 29, 36	Доцетаксел	36	0,9% NaCl	100	1 час	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50			
Доцетаксел																																																				

### Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
50 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
4

#### Примечание:

Доцетаксел разводят до 0,3-0,74 мг/мл.

Риск возникновения мукозита снижают путем сокращения цикла (сутки 1, 8, 15, повторно - 29 сутки).

Сопутствующая медикация: Дексаметазон 8 мг орально 2 раза в день в течение 3 суток, начиная в 1 день перед приемом Доцетаксела.

В случае отсутствия реакции гиперчувствительности, дозу Доксаметазона можно снизить до 2х 4 мг орально в день приема Доцетаксела.

#### Литература:

Hainsworth J.D. et al., J Clin Oncol 19: 3500ff, 2001.

