

Цисплатин / Ралтитрексид ХС812 (европейський протокол) Мезотелиома

Дни терапії	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
6	Винкрестин	1(*)	5% Глюкоза	0	-	внутривенно
5	Доцетаксел	36	5% Глюкоза	0	-	внутривенно
5	Флюороурацил	400	5% Глюкоза	0	-	внутривенно
1	Цисплатин	80	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Винкрестин																					
Доцетаксел																					
Флюороурацил																					
Цисплатин																					

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:

Цисплатин (только если СКФ ≥60 мл/мин.):

Сопутствующая медикация:

Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв

KCl + 8 мЭкв MgSO₄ внутривенно в течение 60 мин.

200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.

Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.

Литература:

Van Meerbeeck J.P. et al., J Clin Oncol 23: 688ff, 2005.

