



Цисплатин / Ралтитрексид ХС812 (европейский протокол) Мезотелиома

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения		
6	Винкристин	1(*)	5% Глюкоза	0	-	внутривенно		
5	Доцетаксел	36	5% Глюкоза	0	-	внутривенно		
5	Флюороурацил	400	5% Глюкоза	0	-	внутривенно		
1	Цисплатин	80	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно		

График введения препаратов:

- parpun																					
н	2	m	4	72	9	7	∞	ი	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Вин	Винкристин																				
Доц	Доцетаксел																				
Флюороурацил																					
Цисплатин																					

Дополнительная информация

повторно на: 22 (день)

количество циклов: 6

Примечание:

Цисплатин (только если СКФ ≥60 мл/мин.):

Сопутствующая медикация:

Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO4 внутривенно в течение 60 мин. 200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.

Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно

+ 10 мЭкв КСІ.

Литература:

Van Meerbeeck J.P. et al., J Clin Oncol 23: 688ff, 2005.

