

# Ибрутиниб ХА149 (европейский протокол) НХЛ хроническая

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1-30	Ибрутиниб	420 (const)	-	0	-	перорально

## График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Ибрутиниб																															

## Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
31 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
постоянный прием

Повторно: \* Постоянный прием.

Примечание:

Для лечения мантийноклеточной лимфомы рекомендованная доза составляет 560 мг/сутки.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Byrd J.C. et al., N Engl J Med 371: 213ff, 2014;

Wang M.L. et al., N Engl J Med 369: 507ff, 2013.

