

# **EVANS CAV XC032 (европейский протокол) - Часть 1**

## **Мелкоклеточный рак легкого - МРЛ**

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Винкристин	1,4(*)	0,9% NaCl	100 мл	10 минут	внутривенно
1	Доксорубицин	50	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно
1	Циклофосфамид	1000	0,9% NaCl	1000 мл	2 часа	внутривенно

**График введения препаратов:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>Винкристин</b>																																
<b>Доксорубицин</b>																																
<b>Циклофосфамид</b>																																

**Дополнительная информация**

ПОВТОРНО НА:  
**43 (день)**

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
**3**

**Внимание - схема лечения должна проводится только с - EVANS CAV XC032 (европейский протокол) - Часть 2.**

**Повторно: Сутки 22 (поочередно).**

**Количество циклов: 6 (3x CAV и 3x поочередно с Цисплатином/Этопозидом).**

**Примечание:**

**Цисплатин (только если СКФ  $\geq 60$  мл/мин.):**

**Сопутствующая медикация:**

**Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO4 внутривенно в течение 60 мин.**

**200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.**

**Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.**

**Внимание! Доксорубицин может быть кардиотоксичным при общей дозе  $\geq 500$ мг/м2.**

**(\*) Винкристин, макс. количество доз - 2 мг.**

**Месна: 20% дозы Циклофосфамида внутривенно или орально через 0, 4, 8 часов после приема Циклофосфамида. Надлежащий диурез.**

**Если общая доза составляет  $\geq 200$  мг, Этопозид растворяют в 1000 мл 0,9% раствора NaCl.**

**Литература:**

**Evans W.K. et al., Ann Int Med 107: 451ff, 1987.**

