

**Цисплатин / Винорелбин / Цетуксимаб ХС336 (сутки 1) + ХА070; ХС884 (сутки 8) + ХА070; ХА070 (сутки 15) (европейский протокол) Немелкоклеточный рак легкого - НМРЛ**

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1,8	Винорелбин	25	0,9% NaCl	100 мл	10 минут	внутривенно
1	Метотрексат	30	5% Глюкоза	0	-	перорально
1,8,15	Цетуксимаб	250	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно
1	Цисплатин	80	0,9% NaCl	1000 мл	2 часа	внутривенно

**График введения препаратов:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Винорелбин</b>																					
■							■														
<b>Метотрексат</b>																					
■																					
<b>Цетуксимаб</b>																					
■							■							■							
<b>Цисплатин</b>																					
■																					

**Дополнительная информация**

**ПОВТОРНО НА:  
22 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6**

**Примечание:**

**Винорелбин вводится быстро внутривенно.**

**(Внимание! Тромбофлебит; угроза некроза после экстравазации, поэтому желательно применение катетера "Port-A-Cath").**

**После чего 250 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно.**

**Цисплатин (только если СКФ ≥60 мл/мин.):**

**Сопутствующая медикация:**

**Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO4 внутривенно в течение 60 мин.**

**200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.**

**Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.**

**(\*) Цетуксимаб: Первое введение - в течение 120 минут в дозе 400 мг/м2 до начала химиотерапии. В соответствии с протоколом исследований, прием Цетуксимаба продолжается после завершения химиотерапии в течение обострения болезни или недопустимой токсичности.**

**Литература:**

**Pirker R. et al., Lancet 373: 1525ff, 2009.**

