chemoteka.com



Иделалисиб / Ритуксимаб XA149 + XA090 (европейский протокол) НХЛ хроническая

Дни терапии	Лекарствен ное средство	Дозировка, мг/м²	Растворител ь	Объем (мл/ шт)	Время введения	Путь введения	
1-14	Иделалисиб	300 мг (const)	-	0	-	перорально	
1	Ритуксимаб	375	0,9% NaCl	500 мл	5 часов (3 часа)	внутривенно	

График введения препаратов:

	2	т	4	2	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15
Иделалисиб														
Ритуксимаб														

Дополнительная информация

повторно на: **15 (день)**

количество циклов: 8



Повторно: * Постоянный прием.

** Ритуксимаб каждые 2 недели по 4 дозы, затем каждые 4 недели по 3 дозы - всего 8 инфузий. Примечание:

(**) Ритуксимаб 500 мг/м², начиная с 2 цикла и далее. Ритуксимаб: Начальная скорость инфузий - 50 мг/ч; через 30 минут ее можно увеличивать на 50 мг/ч каждые 30 минут, максимально до 400 мг/ч. Дальнейшие дозы вводятся на начальной скорости 100 и увеличиваются на 100 мг/ч каждые 30 минут, максимально до 400 мг/ч. Рекомендована премедикация - 30 мг Дифенгидрамина.

Авторы: <u>Thomas Kühr</u>, <u>Ewald Wöll</u>, <u>Josef Thaler</u> (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г. Литература:

Furman R.R. et al., N Engl J Med 370: 997ff, 2014.