

Иделалисиб / Ритуксимаб ХА149 + ХА090 (европейский протокол) НХЛ хроническая

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1-14	Иделалисиб	300 мг (const)	-	0	-	перорально
1	Ритуксимаб	375	0,9% NaCl	500	5 часов (3 часа)	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Иделалисиб														
Ритуксимаб														

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
15 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
8

Повторно: * Постоянный прием.

** Ритуксимаб каждые 2 недели по 4 дозы, затем каждые 4 недели по 3 дозы - всего 8 инфузий.

Примечание:

(**) Ритуксимаб 500 мг/м², начиная с 2 цикла и далее.

Ритуксимаб: Начальная скорость инфузий - 50 мг/ч; через 30 минут ее можно увеличивать на 50 мг/ч каждые 30 минут, максимально до 400 мг/ч.

Дальнейшие дозы вводятся на начальной скорости 100 и увеличиваются на 100 мг/ч каждые 30 минут, максимально до 400 мг/ч.

Рекомендована премедикация - 30 мг Дифенгидрамина.

Литература:

Furman R.R. et al., N Engl J Med 370: 997ff, 2014.

