

## Иделалисиб / Ритуксимаб ХА149 + ХА090 (европейский протокол) НХЛ хроническая

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1-14	Иделалисиб	300 мг (const)	-	0	-	перорально
1	Ритуксимаб	375	0,9% NaCl	500 мл	5 часов (3 часа)	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Иделалисиб</b>														
<b>Ритуксимаб</b>														

### Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:  
15 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
8**

**Повторно: \* Постоянный прием.**

**\*\* Ритуксимаб каждые 2 недели по 4 дозы, затем каждые 4 недели по 3 дозы - всего 8 инфузий.**

**Примечание:**

**(\*\*) Ритуксимаб 500 мг/м<sup>2</sup>, начиная с 2 цикла и далее.**

**Ритуксимаб: Начальная скорость инфузий - 50 мг/ч; через 30 минут ее можно увеличивать на 50 мг/ч каждые 30 минут, максимально до 400 мг/ч.**

**Дальнейшие дозы вводятся на начальной скорости 100 и увеличиваются на 100 мг/ч каждые 30 минут, максимально до 400 мг/ч.**

**Рекомендована премедикация - 30 мг Дифенгидрамина.**

**Литература:**

**Furman R.R. et al., N Engl J Med 370: 997ff, 2014.**

