

Цисплатин / Винорелбин / Цетуксимаб ХС336 (сутки 1) + ХА070; ХС884 (сутки 8) + ХА070; ХА070 (сутки 15) (европейский протокол) Немелкоклеточный рак легкого - НМРЛ

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1,8	Винорелбин	25	0,9% NaCl	100 мл	10 минут	внутривенно
1,8,15	Цетуксимаб	250	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно
1	Цисплатин	80	0,9% NaCl	1000 мл	2 часа	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Винорелбин																					
■							■														
Цетуксимаб																					
■							■							■							
Цисплатин																					
■																					

Дополнительная информация

Примечание:

Винорелбин вводится быстро внутривенно. (Внимание! Тромбофлебит; угроза некроза после экстравазации, поэтому желательно применение катетера "Port-A-Cath").

После чего 250 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно.

Цисплатин (только если СКФ ≥60 мл/мин.):

Сопутствующая медикация:

Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO4 внутривенно в течение 60 мин.

200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.

Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.

(*) **Цетуксимаб:** Первое введение - в течение 120 минут в дозе 400 мг/м² до начала химиотерапии. В соответствии с протоколом исследований, прием Цетуксимаба продолжается после завершения химиотерапии в течение обострения болезни или недопустимой токсичности.

Литература:

Pirker R. et al., Lancet 373: 1525ff, 2009.

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

