

Бортезомиб / Ритуксимаб - Циклососфамид Доксорубицин / Преднизон ХА020 + ХА090 (европейский протокол) НХЛ хроническая

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1, 4, 8, 11	Бортезомиб	1,3	-	0	-	подкожно
1	Доксорубицин	50	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно
1-5	Преднизон	100	-	0	-	перорально
1	Ритуксимаб	375	0,9% NaCl	500 мл	5 часов (3 часа)	внутривенно
1	Циклофосфамид	750	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Бортезомиб																					
■			■				■			■											
Доксорубицин																					
■																					
Преднизон																					
■	■	■	■																		
Ритуксимаб																					
■																					
Циклофосфамид																					
■																					

Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:
22 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6**

Количество циклов: 6-8.

Примечание:

Ритуксимаб: Начальная скорость инфузий - 50 мг/ч; через 30 минут ее можно увеличивать на 50 мг/ч каждые 30 минут, максимально до 400 мг/ч.

Дальнейшие дозы вводятся на начальной скорости 100 и увеличиваются на 100 мг/ч каждые 30 минут, максимально до 400 мг/ч. Рекомендована премедикация - 30 мг Дифенгидрамина.

Внимание! Доксорубицин может быть кардиотоксическим при общей дозе ≥500 мг/м².

Месна: 20% дозы Циклофосфамида, через 0, 4, 8 ч после приема Циклофосфамида (перорально или внутривенно).

Концентрация Бортезомиба - 2,5 мг/мл.

Авторы: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (руководство «Протоколы химиотерапии 2016. Текущие протоколы и таргетная терапия» (17-е издание, Инсбрук).

Последнее изменение содержания: январь 2016 г.

Литература:

Robark T. et al., N Engl J Med 372: 944ff, 2015.

