

## Доцетаксел / Карбоплатин / Трастузумаб ХА110 + ХС184 (европейский протокол) Рак молочной железы

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Доцетаксел	75	0,9% NaCl	250 мл	1 час	внутривенно
1	Карбоплатин	AUC 6	5% Глюкоза	500 мл	30 минут	внутривенно
1	Трастузумаб	6 мг/кг	0,9% NaCl	250 мл	90 минут	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Доцетаксел</b>																					
<b>Карбоплатин</b>																					
<b>Трастузумаб</b>																					

### Дополнительная информация

**Количество циклов:** Адьювант Трастузумаба в течение 1 года;

Доцетаксел и Кабоплатин в течение 6 циклов.

**Примечание:**

Доцетаксел разводят до 0,3-0,74 мг/мл.

**Сопутствующая медикация:** Дексаметазон 8 мг орально 2 раза в день в течение 3 суток, начиная в 1 день перед приемом Доцетаксела.

**Расчет дозы Карбоплатина (формула Calvert):**

Доза (мг) = целевая AUC x (СКФ + 25).

(\***)** Фиксированная нагружающая доза" Трастузумаба - 8 мг/кг, со скоростью первого введения в течение 90 минут. В случае хорошей переносимости последующие дозы можно вводить в течение 30 минут.

Трастузумаб можно также назначать подкожно в постоянной дозе 600 мг/5 мл.

**Литература:**

Slamon D. et al., N Engl J Med 365 (14): 1273ff, 2011; Ismael G. et al., Lancet Oncol 13: 869ff, 2012.

**ПОВТОРНО НА:  
22 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
6**

