

# EVANS CAV XC032 (европейский протокол) - Часть 1

## Мелкоклеточный рак легкого - МРЛ

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м <sup>2</sup>	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1	Циклофосфамид	1000	0,9% NaCl	1000 мл	2 часа	внутривенно

### График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Циклофосфамид																															

### Дополнительная информация

**Внимание - схема лечения должна проводиться только с - EVANS CAV XC032 (европейский протокол) - Часть 2.**

**Повторно: Сутки 22 (поочередно).**

**Количество циклов: 6 (3х CAV и 3х поочередно с Цисплатином/Этопозидом).**

**Примечание:**

**Цисплатин (только если СКФ ≥60 мл/мин.):**

**Сопутствующая медикация:**

**Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO<sub>4</sub> внутривенно в течение 60 мин.**

**200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.**

**Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.**

**Внимание! Доксорубин может быть кардиотоксичным при общей дозе ≥ 500мг/м<sup>2</sup>.**

**(\*) Винкрестин, макс. количество доз - 2 мг.**

**Месна: 20% дозы Циклофосфамида внутривенно или орально через 0, 4, 8 часов после приема Циклофосфамида. Надлежащий диурез.**

**Если общая доза составляет ≥200 мг, Этопозид растворяют в 1000 мл 0,9% раствора NaCl.**

**Литература:**

**Evans W.K. et al., Ann Int Med 107: 451ff, 1987.**

**ПОВТОРНО НА:  
43 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
3**

