

IMVP-16 ХС656 (европейский протокол) НХЛ острая

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1-5	Ифосфамид	1000	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутривенно
3,10	Метотрексат	30	0,9% NaCl	100 мл	15 минут	внутривенно
1-3	Этопозид	100	0,9% NaCl	500 мл	2 часа	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Ифосфамид																					
■	■	■	■	■																	
Метотрексат																					
		■							■												
Этопозид																					
■	■	■																			

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
2

Примечание:

Если общая доза составляет ≥ 200 мг, Этопозид растворяют в 1000 мл 0,9% раствора NaCl. Месна: 200 мг/м² в 500 мл 0,9% раствора NaCl в течение 30 минут сразу после приема Ифосфамида, затем 1000 мг/м² в течение 12 часов. (начиная с приема Ифосфамида).

Литература:

Cabanillas F. et al., Blood 60: 693ff, 1982.

