ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

FOLFIRINOX XC588 (европейский протокол) Рак поджелудочной железы и холангиоцеллюлярная карцинома

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м^2	Растворитель	Объем (мл / шт)	Время введения	Путь введения
1,15	Иринотекан	180	0,9% NaCl	500 мл	90 хвилин	внутривенно
1,15	Кальция фолинат	400	0,9% NaCl	250 мл	2 години	внутривенно
1,15	Оксалиплатин	85	5% Глюкоза	500 мл	2 години	внутривенно
1,15	Флюороурацил	400	-	0	Болюс	внутривенно
1,15	Флюороурацил	2400	0,9% NaCl	500 мл	46 годин	внутривенно

График введения препаратов:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Иринотекан																													
	■														■														
Кальция фолинат																													
	■														■														
Оксалиплатин																													
	■														■														
Флюороурацил																													
	■														■														
Флюороурацил																													
	■														■														

Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

Примечание:
Внимание! Иринотекан может вызвать опасную для жизни диарею и холинергический синдром. Диарея может возникнуть либо в острой форме, либо в некоторые дни после введения Иринотекана.
Сопутствующая медикация: Атропин 0,2 мг подкожно или внутривенно.
В случае диареи: Лоперамид, сначала 4 мг, затем по 2 мг каждые 2 часа. Прием Лоперамида следует продолжать еще в течение 12 часов после прекращения диареи. Если она сохраняется более 48 часов или в случае лихорадки, рекомендовано назначение Ципрофлоксацина и госпитализация.
(*) Кальций фолинат как модулятор 5-флуороурацила должен применяться перед 5-флуороурацилом.
5FU можно вводить при помощи инфузионного насоса амбулаторно.
Литература:
Conroy T. et al., N Engl J Med 364: 1817ff, 2011.