

Цисплатин / Гемцитабин + Бевацизумаб ХС592 + ХА060 (европейский протокол) Немелкоклеточный рак легкого - НМРЛ

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м ² | Растворитель | Объем (мл / шт) | Время введения | Путь введения |
|-------------|------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1 | Бевацизумаб | 7,5 мг/кг | 0,9% NaCl | 100 мл | 90 минут | внутривенно |
| 1,8 | Гемцитабин | 1250 | 0,9% NaCl | 250 мл | 30 минут | внутривенно |
| 1 | Цисплатин | 80 | 0,9% NaCl | 1000 мл | 2 часа | внутривенно |

График введения препаратов:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Бевацизумаб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гемцитабин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цисплатин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Дополнительная информация

Примечание:

(*) Бевацизумаб: Начальную дозу вводят в течение 90 минут. В случае хорошей переносимости первой инфузии, вторую инфузию вводят в течение 60 минут. В случае хорошей переносимости 60-минутной инфузии, все последующие инфузии можно вводить в течение 30 минут.

В соответствии с ЕМА, Бевацизумаб, как дополнение к химиотерапии препаратами платины, был утвержден в дозе 7,5 мг/кг или 15 мг/кг.

Цисплатин (только если СКФ ≥60 мл/мин.):

Сопутствующая медикация:

Премедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl + 10 мЭкв KCl + 8 мЭкв MgSO4 внутривенно в течение 60 мин.

200 мл 20% раствора Маннита в течение 30 мин.

Постмедикация: 500 мл 0,9% раствора NaCl внутривенно + 10 мЭкв KCl.

Литература:

Reck M. et al., J Clin Oncol 27: 1227ff, 2009.

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6

