

# IMVP-16 ХС656 (европейский протокол) НХЛ острая

| Дни терапии | Лекарственное средство | Дозировка, мг/м <sup>2</sup> | Растворитель | Объем (мл) | Время введения | Путь введения |
|-------------|------------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| 1-5         | Ифосфамид              | 1000                         | 0,9% NaCl    | 500        | 1 час          | внутривенно   |
| 3,10        | Метотрексат            | 30                           | 0,9% NaCl    | 100        | 15 минут       | внутривенно   |
| 1-3         | Этопозид               | 100                          | 0,9% NaCl    | 500        | 2 часа         | внутривенно   |

## График введения препаратов:

| 1                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>Ифосфамид</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ■                  | ■ | ■ | ■ | ■ |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Метотрексат</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                    |   | ■ |   |   |   |   |   | ■ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Этопозид</b>    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ■                  | ■ | ■ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

## Дополнительная информация

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:  
2

### Примечание:

Если общая доза составляет  $\geq 200$  мг, Этопозид растворяют в 1000 мл 0,9% раствора NaCl.

Месна: 200 мг/м<sup>2</sup> в 500 мл 0,9% раствора NaCl в течение 30 минут сразу после приема Ифосфамида, затем 1000 мг/м<sup>2</sup> в течение 12 часов. (начиная с приема Ифосфамида).

### Литература:

Cabanillas F. et al., Blood 60: 693ff, 1982.

