

Оксалиплатин / Иринотекан ХС672 (европейский протокол) Рак желудка

Дни терапии	Лекарственное средство	Дозировка, мг/м ²	Растворитель	Объем (мл)	Время введения	Путь введения
1,15	Иринотекан	125	0,9% NaCl	500	30 минут	внутривенно
1,15	Оксалиплатин	85	5% Глюкоза	500	2 часа	внутривенно

График введения препаратов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Иринотекан																												
■														■														
Оксалиплатин																												
■														■														

Дополнительная информация

**ПОВТОРНО НА:
29 (день)**

**КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ:
6**

Примечание:

Внимание! Иринотекан может вызвать опасную для жизни диарею и холинергический синдром. Диарея может возникнуть либо в острой форме, либо в некоторые дни после введения Иринотекана.

Сопутствующая медикация: Атропин 0,2 мг подкожно или внутривенно.

В случае диареи: Лоперамид, сначала 4 мг, затем по 2 мг каждые 2 часа. Прием Лоперамида следует продолжать еще в течение 12 часов после прекращения диареи. Если она сохраняется более 48 часов или в случае лихорадки, рекомендовано назначение Ципрофлоксацина и госпитализация.

Литература:

Wöll E. et al., Anticancer Res 28: 2901ff, 2008.

